

Algesal espuma

Emulsión antidolorosa y antirreumática

PROPIEDADES

ALGESAL espuma incorpora en su composición la Mirtecaína (DCI) laurilsulfato. Este principio activo disminuye notablemente la tensión superficial de la piel, acelerando su penetración y potenciando a su vez la del salicilato de dietilamina. Permite llevar a la zona dolorosa una óptima concentración de principios activos, consiguiendo con ello una rápida y eficaz disminución del dolor.

ALGESAL espuma es una emulsión (aceite/agua) que por acción del gas propelente da lugar a la formación de una espuma no grasa y lavable, ligeramente perfumada, que no irrita la piel y que produce una agradable sensación de frescor.

COMPOSICIÓN

Cada gramo de emulsión contiene: Mirtecaína (DCI) laurilsulfato, 10 mg; Salicilato de dietilamina, 100 mg.

Excipientes: Edetato de disodio, Polisorbato 60, Triglicérido caprílico/cáprico, Parafina líquida ligera, Monoestearato de sorbitano, Alcohol cetílico, Esencia de lavandino y Agua purificada.

TITULAR

Laboratorio STADA, S.L.
Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

FABRICANTE

Recipharm Parets, S.L.
Ramón y Cajal, 2
08150 Parets del Vallès
(Barcelona)

INDICACIONES

Terapia percutánea del dolor local, dolores reumáticos, articulares y musculares, torceduras, tortícolis, lumbago y otros de parecida naturaleza.

POSOLOGÍA

Aplíquese 3 o más veces al día una cantidad suficiente de espuma, según la extensión de la zona dolorosa, practicando un suave masaje hasta su completa absorción.

PRECAUCIONES

No se aplicará sobre heridas abiertas ni mucosas.

ADVERTENCIAS

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DE ESTE MEDICAMENTO

Por contener alcohol cetílico puede provocar reacciones cutáneas en la piel (como dermatitis de contacto).

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Debido a las características de este preparado destinado a uso tópico, es rara la posibilidad de que se produzca una intoxicación. En caso de que ocurra, consulte con su médico o llame al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562.04.20

NORMAS DE ADMINISTRACIÓN



Agitar antes de su utilización.

Pulsar en posición vertical lo más cerca posible de la zona dolorosa.



No inclinar el frasco durante su empleo.

PRESENTACIÓN

Envases con 60 y 100 gramos de emulsión.

SIN RECETA MÉDICA

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS**



**Laboratorio STADA, S.L.
Frederic Mompou, 5,
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)**