

Anginovag

Este archivo lo ha descargado desde la web www.farmacijimenezsesma.com

Anginovag[®] aerosol

NUEVO ENVASE ECOLÓGICO: PARA PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA SE HA ELIMINADO EL GAS FREON.

NO RETIRE LA CÁNULA DEL FRASCO UNA VEZ ENSAMBLADA Y USADA.

Acción farmacológica

Anginovag reúne en su fórmula principios activos de acciones antiinflamatoria/analgésica y antibiótica. Se presenta en forma de spray con válvula dosificadora por lo cual es adecuado en la terapia preventiva y curativa de las afecciones bucofaringeas.

Composición

Cada 100 ml contienen: Ácido β-glicirretínico, 60 mg; Decualinio cloruro, 100 mg; Tirotricina, 400 mg; Acetato de hidrocortisona, 60 mg; Lidocaina clorhidrato, 100 mg; Excipientes: (Sacarina sódica) c.s.p. 100 ml.

Indicaciones

Terapéutica preventiva y curativa de las afecciones bucofaringeas: Amigdalitis, faringitis, laringitis, estomatitis, úlceras, aftas, glositis.

Posología

Dosis de ataque: 1-2 aplicaciones cada 2-3 horas.
Dosis de sostén o preventiva: una aplicación cada 6 horas.

Contraindicaciones/Efectos secundarios/Interacciones

No se conocen.

Precauciones

Para una correcta administración, se recomienda poner el frasco vertical, con la cánula orientada al lugar de la aplicación, pero sin introducir totalmente en la boca. Presionar la parte superior de la cápsula de arriba abajo hasta el tope.

Uso durante el embarazo

Puede administrarse.

Sobredosificación y su tratamiento

Dada la escasa toxicidad del preparado, no se prevé la aparición de síntomas de intoxicación, ni incluso en caso de sobredosis.

Presentación

Envase conteniendo 10 ml

No dejar a la vista y al alcance de los niños.

Fabricado por:
FERRER INTERNACIONAL, S.A.