

APIRETAL SUPOSITORIOS¡Error! Marcador no definido.

Paracetamol

COMPOSICION

Por supositorio: NIÑOS ADULTOS
Paracetamol (D.C.I.) 250 mg 500 mg
Excipiente: Glicéridos semisintéticos sólidos.

ACCIÓN

Analgésico, antipirético.

INDICACIONES

Dolor de intensidad leve o moderada. Estados febriles.

POSOLOGIA

ADULTOS:

1 supositorio de APIRETAL ADULTOS (500 mg) cada 4-6 horas. No se excederá de 4 g/24 horas.

Niños:

La posología recomendada para el paracetamol en pediatría es la siguiente:

De 0 a 3 meses: 40 mg
De 4 a 11 meses: 80 mg
De 1 a 2 años: 120 mg
De 2 a 3 años: 160 mg
De 4 a 5 años: 240 mg
De 6 a 8 años: 320 mg
De 9 a 10 años: 400 mg
Mayores de 10 años: 480 mg

Estas dosis se pueden repetir 4 ó 5 veces al día, sin exceder de un total de 5 dosis en 24 horas.

Puede establecerse también un esquema de dosificación de 10 mg/Kg por toma.

Estas dosis equivalen a 1 supositorio de APIRETAL NIÑOS para niños de 4-6 años y 1 supositorio de APIRETAL ADULTOS para niños mayores de 10 años.

Para niños menores de 4-6 años (16-18 kg de peso aprox.) se recomienda la administración de APIRETAL GOTAS, que permite ajustar la dosis según peso y edad.

La administración del preparado está supeditada a la aparición de los síntomas dolorosos o febriles. A medida que éstos desaparezcan debe suspenderse esta medicación.

NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACION

Los supositorios deben introducirse profundamente en el recto, preferentemente después de la evacuación.

Es preferible mantener los supositorios en lugar fresco, principalmente en épocas calurosas, dado que se ablandan y se hace difícil su aplicación.

CONTRAINDICACIONES

Enfermedades hepáticas.

PRECAUCIONES

En pacientes con insuficiencia hepática y/o renal, anemia, afecciones cardíacas o pulmonares, evitar tratamientos prolongados.

No exceder la dosis recomendada.

Se aconseja consultar al médico para usarlo en niños menores de 3 años o en tratamientos de más de 10 días.

ADVERTENCIA

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

EFECTOS SECUNDARIOS

Hepatotoxicidad con dosis altas o tratamientos prolongados.

Raramente pueden aparecer erupciones cutáneas y alteraciones hematológicas como neutropenia o leucopenia.

INTERACCIONES

Puede aumentar la toxicidad del cloranfenicol.

En caso de tratamientos con anticoagulantes orales se puede administrar ocasionalmente como analgésico de elección.

INTOXICACION Y TRATAMIENTO

La sintomatología por sobredosis incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia y dolor abdominal. Si se ha ingerido una sobredosis debe acudir rápidamente a un Centro Médico aunque no haya síntomas, ya que éstos, muy graves, se manifiestan generalmente a partir del tercer día después de su ingestión.

Se considera sobredosis de paracetamol, la ingestión de una sola toma de más de 6 g en adultos y más de 100 mg por kg de peso en niños. Pacientes en tratamiento con barbitúricos o alcohólicos crónicos, pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una sobredosis de paracetamol.

El tratamiento consiste en aspiración y lavado gástrico, carbón activado vía oral, administración intravenosa de N-acetilcisteína a dosis adecuadas y, si es preciso, hemodiálisis.

El período en el que el tratamiento ofrece la mayor garantía de eficacia se encuentra dentro de las 12 horas siguientes a la ingestión de la sobredosis.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACIONES

Supositorios niños: Envase con 5 supositorios de 250 mg de paracetamol. C.N. 960294.

Supositorios adultos: Envase con 5 supositorios de 500 mg de paracetamol. C.N. 960302.

APIRETAL también se presenta en gotas: Frasco con 30 ml y 60 ml de solución, conteniendo 100 mg/ml de paracetamol.

SIN RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS