




# Bexidermil



(Salicilato de trietanolamina)

## Composición

**Aerosol:**  
 Cada ml contiene:  
 Salicilato de trietanolamina 100 mg  
 Excipiente, c.s.p. 1 ml

**Crema:**  
 Cada gramo contiene:  
 Salicilato de trietanolamina 100 mg  
 Excipiente, c.s.p. 1 g

**Gel:**  
 Cada gramo contiene:  
 Salicilato de trietanolamina 100 mg  
 Excipiente, c.s.p. 1 g

**Propiedades:**  
 Analgésico antiinflamatorio externo que penetra y se absorbe rápidamente, produciendo un alivio inmediato del dolor.

**Indicaciones:**  
 Dolor, inflamación y edema post-traumático en golpes, contusiones, esguinces. Inflamación de los ligamentos, de las

articulaciones, inflamación de los tendones. Dolores reumatoideos, musculares y como complementario de las enfermedades reumáticas articulares.

**Posología y modo de empleo:**  
 Aplíquese sobre la zona afecta 2 o 3 veces al día, siendo aconsejable una aplicación adicional a la hora de acostarse.

**Bexidermil Aerosol:**  
 Debe realizarse la pulverización desde una distancia de 10 cm de la piel.

**Bexidermil Crema y Gel:**  
 Debe realizarse un suave masaje hasta que se absorba.

**Contraindicaciones:**  
 Antecedentes de hipersensibilidad a salicilatos.  
 No utilizar sobre piel lesionada y mucosas.  
 No utilizar en niños menores de 10 años.

**Precauciones:**  
 Sólo para uso externo. Si el producto se usa de forma intensa y continuada, puede producirse una ligera descamación de la piel (peeling), reacción normal de la misma al uso de salicilatos que no impide continuar el tratamiento. Deberá utilizarse en aplicaciones locales, no en grandes zonas.  
 No utilizar durante el embarazo y lactancia sin consultar al médico.  
 Si aparece enrojecimiento, agravamiento de los síntomas o si el dolor persiste durante más de 7 días, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.  
 Evitar el contacto con los ojos.

**Interacciones:**  
 No se han descrito.

**Efectos secundarios:**  
 Erupciones en el lugar de aplicación como reacción de hipersensibilidad.

**Intoxicación y su tratamiento:**  
 En la práctica es muy improbable que en la administración por vía tópica se produzcan intoxicaciones.  
 En caso de ingestión por vía oral, deberá darse aviso a un facultativo para que proceda a provocar el vómito y/o lavado gástrico si lo juzga necesario.

**Presentación:**  
**Bexidermil Aerosol.** Frasco de 200 ml.  
**Bexidermil Crema.** Tubo de 50 g.  
**Bexidermil Gel.** Tubo de 50 g.

**Sin receta médica.**  
**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**

Laboratorios ISDIN, S.A.  
 Tucumán, 4  
 08030 Barcelona

Este archivo lo ha descargado desde la web [www.farmaciajimenezsesma.com](http://www.farmaciajimenezsesma.com)

