

Biodramina® cafeína

Dimenhidrinato

Prevención y tratamiento del mareo



Este archivo lo ha descargado desde la web www.farmacijimenezsesma.com

▶ **Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

1. PROPIEDADES

El dimenhidrinato, principio activo fundamental de la serie BIODRAMINA®, es un fármaco de reconocida eficacia en la prevención y el tratamiento del mareo, vértigo y náuseas o vómitos, causados por la locomoción (cinetosis).

La respuesta terapéutica (preventiva o curativa) se presenta a los pocos minutos de la administración y se prolonga durante varias horas. Ocasionalmente, en algunas personas, el dimenhidrinato puede provocar cierta somnolencia, acción que puede evitarse utilizando BIODRAMINA® CAFEINA, cuya composición permite compensar dicho efecto.

2. INDICACIONES

Mareo por locomoción marítima, terrestre o aérea. Vértigo.

3. POSOLOGÍA

1 ó 2 comprimidos media hora antes de iniciar el viaje y repetir estas dosis cada 3-4 horas durante el trayecto. Si el mareo ha aparecido ya, se tomarán dos comprimidos en una sola toma.

Normas posológicas

Los comprimidos de BIODRAMINA® CAFEINA pueden ingerirse enteros o desleídos en cualquier zumo o bebida azucarada. Para ello, pulverizar el comprimido dentro del vaso con ayuda de una cucharita, añadir un poco de líquido, agitar y luego completar el volumen de líquido deseado.

4. CONTRAINDICACIONES

No se conocen.

5. INCOMPATIBILIDADES

Las bebidas alcohólicas pueden potenciar la acción del dimenhidrinato, por lo que no se aconseja su utilización simultánea.

6. EFECTOS SECUNDARIOS

En algunas personas hipersensibles puede aparecer somnolencia.

7. INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

La intoxicación con esta especialidad es rara, dado su elevado coeficiente terapéutico. En caso de intoxicación accidental, que sólo puede producirse por ingestión de dosis muy elevadas, se seguirán las pautas generales para favorecer la rápida eliminación de medicamentos (lavado de estómago, aumento de la diuresis).

8. PRESENTACION Y COMPOSICION

Envases de 4 y 12 comprimidos.
Cada comprimido contiene: 50 mg de dimenhidrinato (DCI), 15 mg de clorhidrato de piridoxina (DCI) y 50 mg de cafeína.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Sin receta médica

Titular de la autorización de comercialización

URIACH-AQUILEA OTC, S.L.

Av. Camí Reial 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona-España)