

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema Clotrimazol

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento está disponible sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente:

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días de tratamiento, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

En este prospecto:

1. Qué es CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema y para qué se utiliza
2. Antes de usar CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema
3. Cómo usar CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema
6. Información adicional

1. QUÉ ES CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Este medicamento pertenece al grupo de medicamentos denominados antifúngicos.

Está indicado para el tratamiento del “pie de atleta”, que es una infección superficial de la piel causada por hongos y localizada entre los pliegues de los dedos del pie.

Los principales síntomas son: picor, enrojecimiento (eritema), grietas entre los dedos, descamación pudiendo llegar a inflamación o pústulas.

2. ANTES DE USAR CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema

No use CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema

- Si es alérgico (hipersensible) al clotrimazol, imidazoles en general o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Tenga especial cuidado con CANESPIE CLOTRIMAZOL

- Debe aplicar el medicamento únicamente sobre la piel y exclusivamente para el tratamiento del pie de atleta.
- Evite el contacto del producto con los ojos y mucosas.
- No ingerir
- No aplique vendajes no transpirables sobre la zona afectada.
- Consulte a su médico si aparece irritación en la zona tratada.
- Utilizar en niños menores de 12 años bajo control médico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Durante los tres primeros meses de embarazo su médico evaluará el balance beneficio riesgo antes de administrar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Información importante sobre alguno de los componentes de CANESPIE CLOTRIMAZOL

Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetosteárico.

3. CÓMO USAR CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema

Siga exactamente las instrucciones de administración de CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Uso cutáneo.

La dosis habitual es de una aplicación sobre la zona afectada de los pies 2 veces al día. El tratamiento debe durar de 2 a 4 semanas.

Aplicar y extender una pequeña cantidad del producto hasta cubrir completamente el área afectada y la zona circundante, con especial atención entre los pliegues de los dedos de los pies. Friccionar hasta su completa absorción. Una tira de crema (1/2 cm de longitud) es suficiente para tratar un área como la palma de la mano.

Para evitar recaídas en estas infecciones, se recomienda continuar el tratamiento durante 2 semanas más, después de desaparecer todos los síntomas. De esta forma aseguramos que se ha regenerado la piel de la zona afectada, ya que el tiempo de renovación de la piel es de 2 a 4 semanas.

Recomendaciones para la utilización de la crema: para una correcta aplicación siga los pasos indicados:

1. Antes de la aplicación del producto, lavar los pies con agua y jabón y secar bien la zona afectada. Después del lavado deben secarse a fondo, sobre todo los espacios interdigitales.
2. Aplíquese una pequeña cantidad del producto y extiéndalo hasta cubrir completamente la zona afectada y el área alrededor de la infección hasta su completa absorción, sobretodo entre los pliegues de los dedos de los pies.
3. Cierre bien el tubo después de su utilización.
4. Lávese las manos después de cada aplicación.

Se aconseja utilizar zapatos bien ventilados, evitar zapatos y suelas de goma, evitar calcetines de fibra y cambiarse los calcetines con cada aplicación debido a la posibilidad de reinfectarse. Para evitar contagios, no se deben compartir toallas, calcetines ni calzado con otras personas ni se debe andar descalzo en piscinas, vestuarios y baños colectivos.

Si a los 10 días de su utilización no observa una mejoría de sus síntomas consulte con su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

Si usted usa más CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/ g crema de la que debiera

Si ha aplicado demasiada cantidad, puede eliminarla lavando la zona afectada con agua templada o simplemente retirando una parte.

Dada la concentración del principio activo y la vía de aplicación no es posible la intoxicación ni en el caso de ingestión accidental. Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento e instaurarse la terapia adecuada.

Se recomienda llevar el envase y el prospecto del medicamento al profesional sanitario.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda a un centro médico inmediatamente o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto consulte a su médico o farmacéutico.

Si olvidó usar CANESPIE CLOTRIMAZOL

Si olvidó usar este medicamento cuando correspondía, aplíquese la crema en cuanto se dé cuenta y continúe con su régimen habitual de tratamiento. No se aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran..

A continuación se indican los posibles efectos adversos cuya frecuencia no se ha establecido con exactitud.

Las reacciones adversas más frecuentes son:

Trastornos del sistema inmunitario:

Reacciones alérgicas (síncope, hipotensión, disnea, urticaria)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:

Ampollas, molestias/dolor, edema, irritación, peeling/exfoliación, prurito, rash, sensación de ardor/quemazón.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE CANESPIE CLOTRIMAZOL 10 mg/g crema

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Caducidad:

No utilice CANESPIE CLOTRIMAZOL después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de la abreviatura CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar a las aguas residuales ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de CANESPIE CLOTRIMAZOL

- Cada gramo de crema contiene 10 mg de clotrimazol como principio activo.

- Los demás componentes (excipientes) son: estearato de sorbitán, polisorbato 60, palmitato de cetilo, alcohol cetosteárico, octildodecanol, alcohol bencílico, agua purificada.

Aspecto del producto y contenido del envase

Crema blanca que se presenta en tubos de aluminio con tapón de cierre de rosca con 30 gramos de contenido.

El titular de la autorización de comercialización

Bayer Hispania, S.L
Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

El responsable de la fabricación

Kern Pharma, S.L.
Polígono Ind. Colón II
C/ Venus 72
08228 Terrassa (Barcelona)

Este prospecto fue aprobado en *Noviembre 2010*