

#### **COMPOSICIÓN:**

Por comprimido recubierto:

Dimenhidrinato: 25 mg

Excipientes: hidrógeno fosfato de calcio dihidrato, almidón de maíz, sílice coloidal anhidra, celulosa microcristalina, povidona, talco, estearato de magnesio, hipromelosa, dióxido de titanio, eritrosina, indigotina, óxido-hidróxido de hierro, macrogol 400, macrogol 6000 en c.s.

#### **PROPIEDADES:**

El dimenhidrinato, además de su acción antihistamínica, tiene la propiedad de prevenir y aliviar la cinetosis, cuadro sintomático debido al movimiento, que se produce con frecuencia en los viajes, caracterizado en general por un estado de mareo, palidez, sudores fríos, salivación, molestias gástricas, náuseas, vómitos, etc.

#### **INDICACIONES:**

cinfam 25 mg comprimidos infantil está indicado principalmente en la prevención y tratamiento del mareo producido por los viajes en coche, tren, avión, barco, etc.

#### **POSOLOGÍA:**

Debe tomarse una dosis aproximadamente media hora antes de salir de viaje y repetir, si es necesario, durante el transcurso del mismo, dejando pasar al menos 4 horas entre una toma y la siguiente. Niños de 2 a 8 años: 1/2 comprimido a 1 comprimido.

Niños de 8 a 12 años: 1 a 2 comprimidos.

Todas estas dosis se pueden tomar hasta 3 veces en 24 horas.

Puede facilitarse la ingestión con un poco de agua o de una bebida dulce.

#### **CONTRAINDICACIONES:**

Glaucoma y trastornos uretro-prostáticos.

#### **PRECAUCIONES:**

La somnolencia que puede producir dimenhidrinato, y que en muchos casos es deseable, deberá tenerse en cuenta por quienes han de conducir vehículos o manejar máquinas

#### **ADVERTENCIA:**

#### **IMPORTANTE PARA LA MUJER**

**Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.**

#### **INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES:**

Ingestión simultánea con otros depresores del S.N.C., como barbitúricos y alcohol, puede producir un aumento de los efectos sedantes.

Sus efectos anticolinérgicos pueden ser potenciados por otros fármacos con acción anticolinérgica (antidepresivos tricíclicos, IMAO, etc.).

**EFFECTOS SECUNDARIOS:**

Somnolencia, sequedad de boca, estreñimiento.

**INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:**

Las dosis recomendadas y el contenido total del envase hacen poco probable una intoxicación. Una sobredosis puede producir convulsiones y/o un delirio alucinatorio. En tal caso, administrar prudentemente anticonvulsionantes de acción rápida por vía I.M. o I.V. y un lavado gástrico, aunque sea tardío.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica Teléfono 91 562 04 20.

**PRESENTACIONES:**

Envases con 4 y 10 comprimidos recubiertos.

**SIN RECETA MÉDICA****LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**