

► Laboratorio

SMITHKLINE BEECHAM

► Drogas

Cítrico, ácido

Sodio, bicarbonato

► [Vea también](#)

Aparato Digestivo : [Laxantes Evacuantes Intestinales](#)

► [Indicaciones](#)

- ☐ Composición: Cada 100 g de polvo efervescente sabor regular contiene: Bicarbonato de Sodio 56,70 g; Acido cítrico 43,30g; Excipientes c.s. Cada 100 g de polvo efervescente sabor limón contiene: Bicarbonato de sodio 56,21 g; Acido cítrico 42,7 g; Excipientes c.s.
- ☐ Acción Terapéutica: Antiácido.
- ☐ Indicaciones: Eno es eficaz para el tratamiento y manejo sintomático de los desórdenes gastrointestinales superiores tales como: reflujo gastroesofágico, acidez estomacal y dispepsia. Alivia las molestias estomacales, los efectos producidos por el exceso de comida o bebida, como también la hinchazón estomacal y las náuseas.
- ☐ Posología: *Adultos y niños mayores de 12 años*: 5 g (un sachet o una cucharada de 5 ml de polvo) disuelto en un vaso de agua. La dosificación puede repetirse cada 2- 3 horas hasta cinco veces al día. Intervalo mínimo de dosificación: 2 horas. La dosis diaria máxima (DDM): 5 x 5 g. El periodo máximo de uso de antiácidos a DDM es de 14 días.
- ☐ Efectos Colaterales: Eno es generalmente bien tolerado y seguro. Casualmente se puede presentar el efecto siguiente debido a sus propiedades farmacológicas: Eructos (se considera un efecto beneficioso), flatulencia, distensión abdominal (debido a la liberación de anhídrido carbónico). Si se consumió en cantidades excesivas, la presencia de bicarbonato de sodio puede causar los calambres del estómago, eructos y flatulencia así como carga excesiva de sodio o alcalosis metabólica.
- ☐ Advertencias: No tomar este medicamento si se es alérgico a este medicamento o a alguno de sus componentes. *Embarazo y Lactancia*: consultar al médico si está embarazada o se está amamantando. Las personas con una dieta sodio-restringida no deben tomar dosis múltiples de este producto a menos que sea indicado por su médico. Se recomienda consultar al médico la dosis antes de administrar este medicamento a niños menores de 12 años. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Frente a cualquier duda, consultar al químico-farmacéutico.
- ☐ Interacciones Medicamentosas: Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos de prescripción.
- ☐ Conservación: Guardar en un lugar seco y a temperatura menor de 25°C. Mantener fuera del alcance de niños. Las botellas: guardar el recipiente firmemente cerrado.
- ☐ Presentaciones: **Polvo efervescente sabor regular**: envases conteniendo 5 g y 110 g. **Polvo efervescente con sabor a limón**: envases conteniendo 5 y 110 g.

