

Introducción

Prospecto: información para el usuario

IMONOGAS 120 mg cápsulas blandas

Simeticona

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días de tratamiento.

Contenido del prospecto:

1. Qué es IMONOGAS y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar IMONOGAS
3. Cómo tomar IMONOGAS
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de IMONOGAS
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Imonogas y para qué se utiliza

Este medicamento actúa rompiendo los gases atrapados que causan hinchazón. Está indicado para el tratamiento sintomático de los gases (flatulencia) en adultos. Debe consultar a un médico si empeora o no mejora después de 10 días.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Imonogas

No tome IMONOGAS

- si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de Imonogas (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico si:

- no mejora después de 10 días de tratamiento
- tiene estreñimiento prolongado

Niños y adolescentes

No utilizar en niños y adolescentes menores de 18 años.

Toma de Imonogas con otros medicamentos

Comunique a su médico o farmacéutico que está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Aunque este medicamento no se absorbe, no se recomienda su uso en embarazadas. Este medicamento puede ser utilizado durante la lactancia, ya que la simeticona no se excreta por la leche materna.

Conducción y uso de maquinas

Este medicamento no tiene influencia sobre la capacidad para conducir o usar máquinas.



3. Cómo tomar Imonogas

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico. La dosis recomendada en adultos es de 1 cápsula, después de cada una de las principales comidas.

Uso en niños y adolescentes

Este medicamento está indicado sólo para adultos. Los niños y adolescentes menores de 18 años no lo deben tomar.

Este medicamento se toma por vía oral.

Ingiera la cápsula con una cantidad suficiente de líquido, preferentemente un vaso de agua, nunca con zumo de pomelo o leche.

No tomar más de 4 cápsulas (500 mg) al día.

Si después de 10 días de tratamiento no mejora o empeora, debe suspenderlo y consultar al médico.

Si toma más Imonogas del que debiera

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico, o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 (indicando el medicamento y la cantidad ingerida).

Si olvidó tomar Imonogas

Tome 1 cápsula después de la siguiente comida principal. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.



4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Imonogas puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de la simeticona se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud:

- Reacciones alérgicas, tales como erupción cutánea, picor, hinchazón de cara y lengua o dificultad para respirar.
- Náuseas, estreñimiento, vómitos.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.



5. Conservación de Imonogas

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blister o el envase después de "Caducidad". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudara a proteger el medio ambiente.



6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Imonogas

El principio activo es Simeticona. Cada cápsula contiene 120 mg de simeticona. Los demás componentes (excipientes) son: gelatina y glicerol (E- 422).

Aspecto del producto y contenido del envase

Imonogas es una cápsula blanda de gelatina transparente. Cada envase contiene 20, 40 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular de la autorización Johnson & Johnson S.A. Paseo Doce Estrellas, 5-7

28042-Madrid. España

Responsable de la fabricación

Catalent France Beenheim S.A., 74 rue Principale.
67930 Beenheim, Francia

Fecha de la última revisión de este prospecto: Marzo 2013

Consejos de Educación Sanitaria

¿Qué hacer si usted tiene problemas digestivos?

Indigestión:

Puede tener problemas si usted: Come demasiado

Come comidas ricas en grasas

Come demasiado rápido, sin masticar Bebe demasiado alcohol con las comidas Trate de evitar estos desencadenantes. **Gases (flatulencia):**

Con algunas comidas es más probable la aparición de gases porque: Contienen aire por sí mismas (por ejemplo bebidas gaseosas, pan fresco)

Contienen altos niveles de carbohidratos los cuales no se absorben (por ejemplo, verduras secas, repollo, verduras crudas, cebollas).Trate de evitar estas comidas.

Consulte a su médico o farmacéutico si necesita más información.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios