

Este archivo lo ha descargado desde la web www.farmacijimenezsesma.com

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado INISTON MUCOLÍTICO para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 5 días de tratamiento, o se produce: fiebre, erupciones en la piel, dolor de cabeza persistente o dolor de garganta, debe consultar a un médico.

En este prospecto se explica:

1. Qué es INISTON MUCOLÍTICO y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar INISTON MUCOLÍTICO
3. Cómo tomar INISTON MUCOLÍTICO
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de INISTON MUCOLÍTICO



MUCOLÍTICO
Carbocisteína

Cada 5 ml de solución contienen 250 mg de carbocisteína como principio activo.

Los demás componentes (excipientes) son Etanol (2,4% v/v), Hidróxido de sodio, Saborizante Mirabelle, Ácido cítrico monohidrato, Carmelosa sódica, Ciclamato de sodio, Parahidroxibenzoato de metilo, Edetato de disodio, Sacarina sódica, Amarillo anaranjado S (E-110), Agua purificada.

TITULAR

Johnson & Johnson, S.A.
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7.
28042. Madrid

RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN

Famar Orléans
5, Avenue de Concy
45071 Orléans Cedex 2, (FRANCIA)

1. QUÉ ES INISTON MUCOLÍTICO Y PARA QUÉ SE UTILIZA

INISTON MUCOLÍTICO es una solución oral. Cada envase contiene 200 ml de solución oral y un vasito dosificador con señales a 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, y 15 ml.

Iniston Mucolítico es un medicamento que actúa disminuyendo la viscosidad del moco, fluidificándolo y facilitando su eliminación.

Este medicamento está indicado para el alivio del exceso de mocos y flemas que aparecen en los procesos gripales, catarrales, o resfriado común.

2. ANTES DE TOMAR INISTON MUCOLÍTICO

No tome INISTON MUCOLÍTICO si:

- Es alérgico a la carbocisteína y sus derivados o a cualquiera de los componentes de este medicamento
- Padece usted: úlcera de estómago o duodeno, asma o cualquier enfermedad respiratoria grave.

Tenga especial cuidado con INISTON MUCOLÍTICO:

Durante los primeros días de tratamiento podrá observar un aumento de mocos y flemas, que irá disminuyendo a lo largo del tratamiento.

Embarazo:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

IMPORTANTE PARA LA MUJER: si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar al médico antes de tomar este medicamento.

Uso en niños

No administre este medicamento a niños menores de 12 años.

Conducción y uso de máquinas:

Debe utilizarse con precaución en aquellas personas cuya actividad requiera atención y que hayan observado vértigos durante el tratamiento con este medicamento.

Información importante sobre algunos de los componentes de INISTON MUCOLÍTICO:

Este medicamento contiene 2,4 % de etanol en volumen final. Cada 5 ml contienen 0,83 g de etanol lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos.

Este medicamento contiene Amarillo anaranjado S (E-110) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

Este medicamento contiene 47,10 mg de sodio por 5 ml, lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con dietas pobres en sodio.

Uso de otros medicamentos

No tome **INISTON MUCOLÍTICO** conjuntamente con medicamentos antitusivos (para la tos) ni con aquéllos que disminuyen las secreciones bronquiales, ya que se puede provocar un acúmulo de moco fluidificado.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. COMO TOMAR INISTON MUCOLÍTICO

Siga las instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

INISTON MUCOLÍTICO es un medicamento que se toma por vía oral.

Las dosis usuales son:

Adultos y niños mayores de 12 años: 15 ml de solución oral (750 mg de carbocisteína) 3 veces al día, lo que significa un máximo diario de 45 ml de la solución oral (2,25 g de carbocisteína).

Una vez que observe mejoría, puede reducir la dosis hasta 10 ml de solución oral (500 mg de carbocisteína) 3 veces al día, lo que significa un máximo diario de 30 ml de la solución oral (1,5 g de carbocisteína).

Se recomienda beber un vaso de agua después de cada dosis y abundante cantidad de líquido durante el día.

Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 5 días de tratamiento, o se produce: fiebre, erupciones en la piel, dolor de cabeza persistente o dolor de garganta, debe consultar a un médico.

Si estima que la acción de **INISTON MUCOLÍTICO** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si usted toma más INISTON MUCOLÍTICO del que debiera:

Si ha tomado usted más **INISTON MUCOLÍTICO** de lo que debe, consulte inmediatamente al médico o al farmacéutico, o bien llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar INISTON MUCOLÍTICO:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, **INISTON MUCOLÍTICO** puede tener efectos adversos.

En algunas ocasiones pueden aparecer náuseas, malestar gástrico o diarreas, que suelen desaparecer al disminuir la dosis.


Raramente se han observado otras reacciones como hemorragia gastro-intestinal, dolor de cabeza, vértigo, picor y erupciones cutáneas.

Si observa éstos o cualquier otro efecto no descrito en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE INISTON MUCOLÍTICO

Mantenga **INISTON MUCOLÍTICO** fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Los medicamentos no se deben de tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Caducidad

No tomar **INISTON MUCOLÍTICO** después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en Enero 2004.**Información adicional para el paciente.**

Algunos procesos gripales y catarrales pueden acompañarse de acumulación de moco en las vías respiratorias. En ocasiones, este moco se hace espeso y se adhiere a las paredes de dichas vías.

Esto explica que en dichos procesos se produzca tos como un mecanismo de defensa del propio organismo ante la aparición de mucosidad, para expulsar las flemas y despejar las vías respiratorias.

INISTON MUCOLÍTICO fluidifica el moco adherido, despegándolo. Al finalizar el proceso catarral o gripal, se produce una disminución de la mucosidad y, por lo tanto, de la tos necesaria para eliminarla.

La información detallada y actualizada de este medicamento esta disponible en la Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>