

# Inistolin Pediátrico Antitusivo

## COMPOSICIÓN

Cada 5 ml contienen:

Pseudoefedrina (D.C.I.), clorhidrato ..... 30 mg

Dextrometorfano (D.C.I.) bromhidrato ..... 10 mg

Sacarosa, Sorbitol , Sacarina sódica, Benzoato sodico, Hidroxibenzoato de metilo, Aroma de fresa, Ponceau 4R (E-124) y agua purificada, c.s.

## PROPIEDADES

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO contiene un descongestionante y un antitusígeno ambos de reconocida eficacia clínica. El Dextrometorfano es un antitusígeno seguro y eficaz. La Pseudoefedrina es un descongestionante de las mucosas del tracto respiratorio superior, especialmente de la mucosa y de los senos nasales.

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO suprime la tos improductiva y descongestiona las vías respiratorias.

## INDICACIONES

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO, está indicado para el alivio temporal de la tos debida a irritaciones de la garganta, bronquios y faringe, tan común en los estados gripales y resfriados. También está indicado para el alivio de la congestión nasal debida al catarro común y sinusitis.

## POSOLOGIA

**Niños de 6 a 12 años:** 5 ml, 3 veces al día.

**Niños de 2 a 5 años:** 2,5 ml, 3 veces al día.

Beber un vaso de agua después de cada dosis de medicación.

## CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO está contraindicado en pacientes que hayan demostrado previamente hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Contraindicado en personas que hayan estado tratadas con antidepresivos tipo inhibidores de la monoaminoxidasa en las dos últimas semanas. Los pacientes con hipertensión hipertiroidismo, diabetes, mellitus o trastornos cardíacos isquémicos, deben utilizar este medicamento únicamente por consejo médico.

Consulte a su médico si la tos persiste más de una semana, o si va acompañada de fiebre alta. Erupciones en la piel o dolor de cabeza persistente.

No administrar a niños menores de 2 años sin consultar al médico.

### IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por el médico.

Este medicamento contiene 2,835 g de sacarosa por cada 5 ml, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

Este medicamento contiene 1 g de sorbitol como excipiente por cada 5 ml, puede causar molestias de estomago y diarrea, no debe de utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control como positivo.





Este medicamento contiene Ponceua 4R (E124) como excipiente, por lo que puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

#### **INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES**

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO debe ser utilizado con precaución en aquellos pacientes bajo tratamiento con supresores del apetito, estimulantes tipo anfetamina y agentes hipotensores. No se debe tomar en casos de tos crónica persistente, tal como la que se presenta en fumadores o asmáticos.

#### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

No son frecuentes. En algunos pacientes la Pseudoefedrina puede causar ligero insomnio. Debido a la presencia de Dextrometorfano, en raras ocasiones puede aparecer somnolencia o molestias gastrointestinales.

#### **INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO**


El medicamento es seguro si no se exceden en las dosis recomendadas.

Los síntomas de una intoxicación por este preparado consisten, en una ligera ansiedad, taquicardia y una ligera hipertensión debido a la presencia de Dextrometorfano, que desaparecen rápidamente provocando el vómito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91-562 04 20)

#### **CONDICIONES DE CONSERVACION**

Conservar por debajo de 25°C. Mantener el envase perfectamente cerrado y protegerlo de la luz.

Los medicamentos no se deben de tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

#### **PRESENTACION**

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO

Envase de 120 y 200 ml.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños**

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7  
28042 Madrid

Fabricante:  
Alcalá Farma, S.L.  
Carretera M-300, Km. 29,920  
Alcalá de Henares  
Madrid

La información detallada y actualizada de este medicamento esta disponible en la Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>

551367/H