

Lacovin

Minoxidil

SOLUCIÓN

COMPOSICIÓN:

Cada ml de solución contiene:

Minoxidil (D.C.I.).....20 mg

Excipientes: 70% etanol, propilenglicol, agua desionizada c.s

INDICACIONES:

Tratamiento de la alopecia androgenética.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION:

Solamente para uso externo. Deberá aplicarse una dosis total de 1 ml cada 12 horas. Las dosis diaria no excederá de 2 ml. Lavar las manos cuidadosamente después de la aplicación Aplicar cuando el cabello y cuero cabelludo estén perfectamente secos. No utilizar secador para acelerar el secado del producto porque la acción del aire puede disminuir su efectividad.

La estimulación del crecimiento del cabello, se produce aproximadamente, después de 4 ó más meses de tratamiento y es variable entre pacientes. La experiencia clínica ha demostrado que después de la discontinuación de minoxidil, se detiene el crecimiento de los nuevos cabellos, pudiendo volver a la apariencia anterior al tratamiento, pasados 3-4 meses.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caso de hipersensibilidad a minoxidil, propilenglicol o alcohol. No debe ser utilizado durante el período de embarazo o lactancia.

EFECTOS SECUNDARIOS:

Los efectos secundarios son poco frecuentes y si aparecen, suelen ser reacciones dermatológicas leves, de las cuales la irritación local es la más común. Otras reacciones incluyen: reacciones alérgicas, vértigo, dolor de cabeza, debilidad, sensación de hormigueo, edema, irritación ocular, alteración del gusto y dolor de piernas.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Las reacciones adversas son infrecuentes, pero sí usted nota alguna de las siguientes reacciones: latidos de corazón acelerados o palpitaciones; aumento rápido e inexplicado de peso; hinchazón de manos, codos y cara; visión borrosa; dolor torácico, de brazos y hombros; signos de indigestión grave o irritación del cuero cabelludo o alguna otra reacción que usted presume, pueda deberse a la aplicación del medicamento, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico. Si padece usted del corazón consulte a su médico antes de utilizar este fármaco.

Estas reacciones pueden aparecer en caso de utilizar dosis muy altas o por ingestión accidental.

Utilice este medicamento de acuerdo con las instrucciones de su médico. En caso de duda consulte a su farmacéutico. Este producto es SOLAMENTE PARA USO EXTERNO.

ADVERTENCIAS :

Advertencias sobre excipientes:

Por contener etanol como excipiente, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO:

En caso de ingestión accidental, avise inmediatamente a su médico. Si padece usted del corazón consulte a su médico antes de utilizar este fármaco.

Estas reacciones pueden aparecer en caso de utilizar dosis muy altas o por ingestión accidental.

Utilice este medicamento de acuerdo con las instrucciones de su médico. En caso de duda consulte a su farmacéutico. Este producto es SOLAMENTE PARA USO EXTERNO.

INCOMPATIBILIDADES:

No se han descrito

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

Aunque no se conocen interacciones con otros medicamentos, informe a su médico sobre cualquier fármaco que esté tomando.

INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACION Y USO:

La aplicación de la dosis total de 1 ml de LACOVIN, se efectuará repartiendo la dosis sobre la zona a tratar con ayuda del cuentagotas. Extender la solución sobre el cuero cabelludo con la yema de los dedos, efectuando un ligero masaje. Lavarse las manos después de la aplicación.

PRESENTACION

Frasco con 60 ml de solución.

La solución puede tomar coloración ligeramente amarilla. El cambio de color no afecta a su efectividad.

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FABRICADO POR:

Laboratorio Reig Jofré, S.A.
08024 Barcelona

Laboratorios GALDERMA, S.A.
Agustín de Foxá, 29
28036 Madrid

