

COMPOSICIÓN:

Nafazolina Clorhidrato 0,30 mg
Agua de Hamamelis 0,08 ml

Excipientes:

Acido bórico, Borato sódico, Cetavlon, Agua purificada, c.s.p. 1,00 ml

PRESENTACIÓN:

Gotas oculares:

- frasco cuentagotas con 8 ml de solución.
- caja con 10 frascos monodosis con 0,5 ml de solución.

PROPIEDADES:

Las GOTAS OCULARES OJOSBEL tienen su origen en una fórmula que ha demostrado su eficacia en la higiene y cuidado de los ojos. Los componentes activos de la especialidad le confieren acciones descongestionante y antiséptica.

Unos ojos limpios gozan de la mejor protección contra posibles contaminaciones por gérmenes patógenos, contra el ataque de la atmósfera densa y los ambientes agresivos (polvo, humo, ácidos...) y son más resistentes a la fatiga.

Papadeando una vez aplicadas las GOTAS OCULARES OJOSBEL, se obtiene un masaje suave, delicado, de la zona conjuntivo-ciliar, que activa la circulación, disminuye el edema y el enrojecimiento del borde ciliar y de la conjuntiva, que son las zonas más fácilmente congestionadas por la fijación prolongada de la vista o irritadas por una exposición excesiva al aire o al sol.

TITULAR:

LAB. DERMOFARM: Can Sant Joan, 08191 Rubí - BARCELONA

FABRICANTE:

C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L.

Via Modena, 15 40019 Sant' Agata Bolognese -Italia-

INDICACIONES:

Alivio sintomático en irritaciones de la conjuntiva, congestiones oculares, conjuntivitis alérgica y enrojecimiento por agentes externos.

CONTRAINDICACIONES:

Las GOTAS OCULARES OJOSBEL, que tienen una acción vasoconstrictora rápida y de efecto duradero, están contraindicadas para los enfermos de glaucoma. Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES:

Adminístrese con precaución cuando puedan existir lesiones de los bordes ciliares o de la conjuntiva. Se usará con precaución en caso de hipersensibilidad a otros agentes simpaticomiméticos oftálmicos. Las gotas no deben aplicarse inmediatamente después de un tratamiento oftálmico específico, para no arrastrar la sustancia administrada ni interferir su absorción. Si no se ha producido mejoría tras 72 horas de tratamiento o si se agravan los síntomas al usar el medicamento, consulte a su médico.

INTERACCIONES:

Las GOTAS OCULARES OJOSBEL, no tienen interacciones medicamentosas específicas.

ADVERTENCIAS:

No debe administrarse a niños menores de 2 años, en los que podrían producirse efectos sistémicos o generales.

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:

Por contener ácido bórico y borato sódico como excipientes está contraindicado en niños menores de 3 años.

POSOLOGÍA:

Aplicar una o dos gotas en cada ojo, tres o cuatro veces al día, sin perjuicio de que tales dosis puedan ser aumentadas si las molestias lo requieren, observando las precauciones y demás advertencias que se indican.

INSTRUCCIONES DE USO:

Para la correcta administración de las GOTAS OCULARES OJOSBEL, incline la cabeza hacia atrás y con el dedo índice separe el párpado inferior para formar una especie de saco. Deje caer una o dos gotas en el saco, nunca en el lagrimal, teniendo cuidado de no rozar el ojo con el extremo del frasco. Mantener el ojo cerrado unos instantes para facilitar que el líquido administrado se distribuya por toda la superficie ocular. La aplicación de las GOTAS OCULARES OJOSBEL no produce molestia alguna: por el contrario, de inmediato proporcionan sensación de frescor y bienestar.

Actúe con pulcritud. Evite tocar el extremo del frasco cuentagotas con las manos o algún objeto.

Esta especialidad es una solución de uso oftálmico. No ingerir.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Una aplicación excesiva de las GOTAS OCULARES OJOSBEL podría dar lugar a trastornos locales (irritación, ardor). En el supuesto caso de una ingestión masiva de las mismas podrían aparecer manifestaciones nerviosas: cefaleas, temblores, mareos. En tales casos acudir a un centro médico indicando el producto y la cantidad aplicada o ingerida. Tratar sintomáticamente.

REACCIONES ADVERSAS:

Si se usa en exceso, el propio medicamento puede provocar irritación ocular. Siga pues, estrictamente, las dosis indicadas en el apartado posología.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

•••

Esta especialidad no debe utilizarse una vez sobrepasada la fecha de caducidad indicada en el envase. Protéjase de la luz. Última revisión del prospecto: Enero 1999.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS