

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado Thrombocid Forte 0,5% POMADA para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días debe consultar a su médico.

En este prospecto se explica:

- 1.- Qué es Thrombocid Forte 0,5% POMADA y para qué se utiliza
- 2.- Antes de utilizar Thrombocid Forte 0,5% POMADA
- 3.- Cómo utilizar Thrombocid Forte 0,5% POMADA
- 4.- Posibles efectos adversos
- 5.- Conservación de Thrombocid Forte 0,5% POMADA

**Thrombocid Forte 0,5% POMADA
Pentosano polisulfato sódico**

Cada 100 g de pomada contienen 500 mg de pentosano polisulfato sódico como principio activo.

Los demás componentes (excipientes) son: Alcohol cetosteárico, cetomacrogol 1000, glicerol (E422), propilenglicol, oleato de decilo, ácido levulínico, parahidroxibenzoato de metilo (E218), parahidroxibenzoato de etilo (E214), parahidroxibenzoato de propilo (E216), parahidroxibenzoato de butilo, dimetilol dimetil hidantoína y agua.

- Titular y fabricante

LACER, S.A.
C/. Sardenya, 350
08025 Barcelona (España)

1.- QUÉ ES Thrombocid Forte 0,5% POMADA Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Este medicamento es una pomada para uso cutáneo que aplicada sobre la piel mejora el flujo sanguíneo favoreciendo la disolución de los coágulos.

Pertenece al grupo farmacoterapéutico de los antivaricosos tópicos.

Se presenta en tubos conteniendo 30 y 60 gramos de pomada.

Thrombocid Forte 0,5% POMADA está indicado para :

- Alivio local sintomático de los trastornos venosos superficiales como pesadez y tirantez en piernas con varices.
- Alivio local sintomático de hematomas superficiales producidos por golpes.

2.- ANTES DE UTILIZAR Thrombocid Forte 0,5% POMADA

No utilice Thrombocid Forte 0,5% POMADA si:

- Tiene alergia conocida a este preparado o a cualquiera de sus componentes.
- Padece alteraciones importantes de la coagulación.
- No aplicar sobre mucosas, úlceras y heridas abiertas o infectadas.

Tenga especial cuidado con Thrombocid Forte 0,5% POMADA ya que:

- Este medicamento es solo para uso externo. No debe ingerirlo.
- Debe utilizarse sólo en piel intacta.
- Debe evitarse el contacto con los ojos.
- En caso de problemas venosos causados por coágulos de sangre (como por ejemplo tromboembolismo), se recomienda aplicar el producto suavemente y sin masaje.
- No debe utilizarse de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel.
- Si los síntomas empeoran o duran más de 5 días, o bien si se produce irritación o empeoramiento, interrumpa la aplicación y consulte a su médico.

- Embarazo y lactancia

Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

- Uso en niños

Consultar al médico.

- Utilización de otros medicamentos

No se recomienda aplicar otros preparados de uso cutáneo en la misma zona.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3.- COMO UTILIZAR Thrombocid Forte 0,5% POMADA

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

- Aplicar una fina capa de pomada sobre la zona de la piel afectada, 3 ó 4 veces al día.

Aplique el preparado efectuando un ligero masaje para facilitar la penetración y lávese las manos después de cada aplicación. Generalmente no hace falta vendaje, aunque puede cubrirse con una gasa o compresa si se cree necesario.

La mejoría suele ser rápida y, en general, acostumbran a ser suficientes tratamientos de 5 a 6 días de duración.

Si estima que la acción de Thrombocid Forte 0,5% POMADA es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

- Si usted utiliza más Thrombocid Forte 0,5% POMADA del que debiera:

Debido a su uso externo, no es probable que se produzcan cuadros de intoxicación. No obstante, si ha utilizado más Thrombocid Forte 0,5% POMADA del que deberia o en caso de ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 62 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos Thrombocid Forte 0,5% POMADA puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente pueden aparecer reacciones alérgicas en el lugar de aplicación, que pueden manifestarse por picor e irritación, y que desaparecen al interrumpir el tratamiento.

Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita en el prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

5.- CONSERVACIÓN DE Thrombocid Forte 0,5% POMADA

Mantenga Thrombocid Forte 0,5% POMADA fuera del alcance y de la vista de los niños.

Mantener el tubo bien cerrado.

- Caducidad

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y el tubo.

- Este prospecto ha sido aprobado: Noviembre 2001

LACER, S.A.
C/. Sardenya, 350 08025 Barcelona
España