

VEROLAX NIÑOS Solución rectal Glicerol

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 2 días, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es VEROLAX y para qué se utiliza
2. Antes de usar VEROLAX
3. Cómo usar VEROLAX
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de VEROLAX
6. Información adicional

1. QUÉ ES VEROLAX Y PARA QUÉ SE UTILIZA

El principio activo de este medicamento es el glicerol. Tras la administración de glicerol por vía rectal, se consigue un efecto laxante por su capacidad para lubricar y para atraer agua hacia las heces, lo que produce un ablandamiento de las mismas. Esto, junto a una ligera acción irritante local, consigue estimular los movimientos intestinales.

El glicerol por vía rectal promueve la evacuación del colon entre 15-30 minutos y una hora tras administración.

Este medicamento se utiliza para el alivio local sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional.

2. ANTES DE USAR VEROLAX

No use VEROLAX

- Si es alérgico (hipersensible) al glicerol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si sufre alteraciones ano-rectales, inflamación hemorrágica del recto y el colon y procesos inflamatorios hemorroidales.
- Si tiene retortijones, cólicos, nauseas, vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, otras dolencias intestinales inflamatorias agudas o en general en cualquier causa de dolor abdominal no diagnosticado.
- En niños menores de 2 años.

Tenga especial cuidado con VEROLAX

- Se debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico en caso de aparición de sangre en heces, irritación rectal, dolor o de que no se produzca mejoría.
- En caso de encontrar resistencia en el momento de la aplicación, debe interrumpirse la misma ya que puede resultar perjudicial y debe consultar a su médico.
- No se debe utilizar este producto durante más de una semana, salvo indicación del médico.
- En pacientes con cuadros patológicos graves, especialmente cardiovasculares, deberá utilizarse únicamente bajo estricto control médico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos incluso los adquiridos sin receta.

No se han descrito interacciones con otros medicamentos

Embarazo y lactancia

No procede.

Uso en niños

No debe administrarse a niños menores de 2 años.

Conducción y uso de máquinas

No procede.

3. CÓMO USAR VEROLAX

Siga estas instrucciones de administración a menos que su médico le haya indicado otras distintas. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Este medicamento se administra por vía rectal.

La dosis normal es:



Niños de 2 a 12 años: una aplicación rectal al día.

No se debe utilizar el producto durante más de una semana, salvo indicación del médico.

Cada aplicador rectal contiene una dosis única de producto. Debe desecharse el mismo tras su uso.

Instrucciones para la correcta administración del preparado:

1. Abrir el aplicador, cogiéndolo por el cuello y girar el tapón, facilitando la rotura del precinto.
2. Oprimir ligeramente para que unas gotas del preparado humedezcan el extremo de la cánula, con objeto de facilitar su introducción en el recto.
3. Introducir suave y lentamente la cánula del aplicador en el recto.
4. Exprimir el contenido del aplicador sin dejar de presionar sobre las paredes del fuelle, retirándolo suavemente una vez vaciado.



Cada aplicador está cargado con un exceso de producto, que queda en el aplicador tras su uso de forma que la cantidad que se libera en la aplicación es la dosis completa y no es necesario vaciarlo totalmente, lo que facilita su manipulación.

En caso de encontrar resistencia en el momento de la aplicación, debe interrumpirse la misma ya que puede resultar perjudicial.

Si usa más VEROLAX del que debiera

El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar al “síndrome de colon irritable”. Por esto, no se debe utilizar el preparado siguiendo otras pautas distintas de las recomendadas, salvo criterio médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica. teléfono 915 620 420, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, VEROLAX puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

- Muy raros (menos de 1 de cada 10.000 pacientes): molestias locales, irritación o prurito (picor) anal.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE VEROLAX

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice VEROLAX después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de VEROLAX

El principio activo es glicerol.

Cada aplicador rectal con 2,5 ml de solución contiene 1,8 ml de glicerol

Los demás componentes son: extracto fluido de Malva sylvestris, extracto fluido de Matricaria chamomilla, almidón de maíz y agua purificada.

Aspecto del producto y contenido del envase:

VEROLAX se presenta en forma de solución rectal. La solución es de color marrón claro y está envasada en frascos unidos de plástico conteniendo 2,5 ml de solución.

Titular de la autorización de comercialización

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.

C. Osi, 7

08034 Barcelona (España)

Responsable de la fabricación

A.C.R.A.F. SpA

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona (Italia)

Este prospecto ha sido aprobado en mayo 2011